ERCEFILM® CE

PANSEMENT PELLICULAIRE TRANSPARENT

FORME ET PRESENTATION

Pansement pelliculaire transparent, appliqué en aérosol et permettant la respiration des tissus.
Boîtier aérosol pressurisé.

REFERENCE	CODE ACL	PRESENTATION	QUANTITE PAR BOITE
05100	609 796-3	Aérosol de 150 ml Autres volumes sur commande spéciale	1 Flacon

COMPOSITION

Polyméthacrylate d'éthoxy éthyle
Acétate d'éthyle
Ethanol
Propulseur agréé.

PROPRIETES

- Protège les tissus de toute recontamination tout en laissant respirer et permettant les bains et les lavages à l'eau et au savon.
- Souple et transparent.
- Bactériostatique : bien que ne contenant pas d'antiseptique, **ERCEFILM®** est peu propice à la prolifération des germes.
- Les tests pré cliniques n'ont pas mis en évidence un risque allergisant.

INDICATIONS

- Remplace le pansement traditionnel.
- Pansement de toute plaie chirurgicale refermée, qui permet de vérifier la cicatrisation en permanence, grâce à la transparence du film.
- En petite chirurgie en préopératoire et postopératoire.
- Permet la visualisation de la plaie afin de dépister toute collection purulente (abcès de paroi).
- Brûlures légères (1er degré uniquement).
- Cicatrices initialement propres. Réalisation d'une barrière aseptique au point de ponction cutanée (abord parentéral).
- Traitement des ampoules par frottement (phlyctènes), des gerçures et des crevasses.
- Aide à la réalisation de contentions non allergiques dans les traumatismes des articulations (entorses).
- Réalisation de pansements renforcés (gaze + **ERCEFILM®**).
- Protège et améliore la tenue des sutures adhésives cutanées. **ERCEFILM®** peut également être vaporisé sur les mains pour assurer leur protection.

CONTRE INDICATIONS

Ne pas vaporiser **ERCEFILM®** sur les muqueuses, ni sur les plaies ou brûlures profondes, étendues ou souillées.
Hypersensibilité à l'un des constituants.

CONSEILS D'UTILISATION

- Bien agiter le flacon. Vaporiser (à environ 10 cm) sur la partie à traiter en couches minces après l'avoir soigneusement nettoyée et asséchée.
- En préopératoire : après désinfection de la partie à traiter, vaporiser **ERCEFILM®** en pellicule mince. Inciser après séchage.
- En postopératoire : nettoyer et assécher soigneusement la plaie suturée avant de vaporiser **ERCEFILM®.**
- Pour réaliser des contentions non allergiques à l'aide de bandes souples extensibles, **ERCEFILM®** permet de fixer ces bandes sur la peau et entre-elles : vaporiser une première couche d'**ERCEFILM®** sur la peau comme adhésif puis après réalisation du bandage, vaporiser une deuxième couche par dessus. Renouveler tous les huit jours.
- **ERCEFILM®** permet, en combinaison avec de la gaze, de réaliser des pansements mécaniquement renforcés tout en conservant une certaine souplesse. Il suffit pour cela d'alterner les couches d'**ERCEFILM®** et de gaze. Il est aisé d'inclure et de fixer des morceaux de gaze sous une pellicule d'**ERCEFILM®**.

ERCEFILM® peut être enlevé à l'aide d'un tampon imbibé d'éther, d'alcool à 90° ou de solvant spécial **ERCESOLVANT®** si son application est récente, soit par décollement en soulevant les bords si son application est ancienne.

- Lorsque **ERCEFILM®** est vaporisé sur une région pileuse, il est recommandé de l'enlever en utilisant un solvant type **ERCESOLVANT®**.
- Pour éviter l'obturation du diffuseur, après emploi, retourner le flacon, la valve en bas et appuyer jusqu'à expulsion totale du liquide restant dans la tubulure interne.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Dans le cas où **ERCEFILM®** est vaporisé sur un sujet non anesthésié, il peut provoquer une légère sensation douloureuse passagère.
- Il convient de ne pas vaporiser **ERCEFILM®** à moins de 10 cm de la peau pour éviter que l'effet froid ne devienne trop intense. Une pulvérisation à trop courte distance ou trop prolongée pourrait provoquer chez les sujets sensibles une rougeur passagère. En cas d'apparition de givre sur la peau, arrêter la pulvérisation.
- Récipient sous pression à protéger contre les rayons solaires
- Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.
- Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser vers les yeux ou inhaler intentionnellement.
- Ne pas avaler.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Ne pas percer ou brûler même après usage. Eliminer les emballages vides hors d'usage par l'intermédiaire d'un organisme habilité.

DUREE DE VALIDITE

La durée de validité de **ERCEFILM®** est de 18 mois après la date de fabrication.

SYMBOLES UTILISES SUR L'ETIQUETTE

⌛ = Utiliser jusque

LOT = Numéro du lot

REF = Référence du produit

⚠ = Attention, voir notice d'instructions

CE = Marquage CE, produit conforme aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

= Produit extrêmement inflammable

Péters SURGICAL
Z.I. LES VIGNES – 42, RUE BENOIT FRACHON
93013 BOBIGNY CEDEX – FRANCE
www.peters-surgical.com
TEL. : 33 (0)1 48 10 62 62
FAX : 33 (0)1 48 91 22 99
E-MAIL : peters@peters-surgical.com